

jande sädesarter der hafva sitt hemvist, nämligen: *juncus acutiflorus* Ehrh., *juncus rariflorus* Hartm., *scheuchzeria palustris* L. samt *eriphorum polystachyon* L. Af sådana kärr finnes en icke liten mängd i Lappmarken.

4. *Fjällmyror* (paludes uliginosæ) finnas aldramest i de björkskogar, som omgifva fjellarnes baser. På dem vexa *scirpus cæspitosus* L., *eriphorum alpinum* L. och icke sällan *carex filiformis* L. Sådana myror äro temmeligen torra och stadige att gå på; men de gifva dåligt foder.

5. *Tufmyror* (paludes cæspitosæ) finnas ganska ymnigt vid låga sjöstränder och äfven i tallskogar. *Tufstarren* (*carex cæspitosa* L.) är här rådande, som, med sina half alns långa tufvor, gör mera skada än gagn på de ängar, hvarest hon fått intrång.

6. *Rismyror* (paludes virgatæ) äro icke sällsynta vid bäckstränder i skogar och fjellar. De bestå af täta och jemnhöga pilbuskar (*salix limosa* Wahlenb.) och tälla på långt håll i fägring med täcka, konstmessiga trädgårshäckar. Hjordarne spisa dem med begärlighet; men vandringsmannen står der likasom i en labyrinth och är i fara, att icke slippa hvarken fram eller tillbaks.

7. *Starrängar* (prata irrigata) finnas vid sjö- och bäckstränder, så väl i det skogiga Lappland, som ock i synnerhet i alla fjeldalar. De öfversvämmas om våren af fjell-

floden, men blifva merändels torra om hösten. Då svajar den svettige slättermannen på dessa jemna fält och samlar en rik skörd för den långa vintern. Af dessa ängar märkas: a) torra *starrängar* eller *rissängar*. Der har *salix hastata* L. gjort sig mästar af fältet och nästan trängt ut alla grässlåg. Dock hafva äfven några trängt in vid hennes sida; ibland dem *arundo stricta* Schrad., *pedicularis sceptrum, Corollin.* samt *poa pratensis, variatio hydrophila mihi*). Dessa slags ängar äro ganska hårdbetna för lian, men lemna ett godt foder, då de blifvit inbergade. b) *Våta starrängar* bestå af *carex aquatilis* Wahlenb., *carex ampulacea* Ehrh., *equisetum limosum* L., *juncus filiformis* L. Dessa ängar äro af naturen så rika, att de knappt kunna förbättras af konsten.

8. *Pölar* (lacunæ) äro gropar, der snövattnet om våren samt regnvattnet om sommaren samlas från kringliggande höjder. De tyckas hysa en leraktig botten, hvarigenom det samlade vattnet icke hinner suga sig ner i jorden så fort, som på andra ställen. Men, då heta somrar infalla, bortdunstar vattnet, hvarpå den gelatinösa gyttjan remnar i terningar. Uti dessa pölar finnas inga vexter, utom *sparganium natans* L., *alopecurus geniculatus* L., *callitriche verana* L. samt stundom *subularia aquatica* L.