

raturens sammansatta inverkan ville och kun-de beräkna vegetationens Quantitet och Qualitet, det vill säga, så väl vextformer-nas mångfald, som deras af temperaturn mo-disicerade life-period, så skulle vegetatio-nen i Skåne i båda fallen förhålla sig till vegetationen i Uppland, som 15 till 12; och Upplands vegetationen till Lapplands, som 12 till 0, eller efter följande schema:

<i>Skåne.</i>	<i>Uppland.</i>	<i>Lappland.</i>
Luft-temp. + 7°, 13. *)	+ 5°. 52.	— 2°, 86.
Jord-temp. + 8°, 10.	+ 6°. 5.	+ 2°, 00.
Comp. + 15°, 23.	+ 12°, 0 2.	— 0°, 86.

Men en sådan theorie vore orimlig, hvarför den icke heller besannas af erfarenheten.

§. 31.

Men, om man betraktar den quantita-tiva vegetationen och jordtemperaturn, så tyckas de i någon mon stå i förhållande till hvarandra. Då finner man följande för-hållande:

*) Temperaturn i Skåne är anförd enligt Mag. Forsanders disputation, utgifven i Lund 1820. Temperaturn i Upsala, enligt Doctor Wahlen-bergs Flora Upsaliensis, samt i Lappland e-ter dess Flora Lapponica.

<i>Skåne.</i>	<i>Uppland.</i>	<i>Lappland.</i>
Jordtemp:	+ 8°, 1	+ 6°, 5.
Växarterna mängd, pha- nerogamer.	950. *)	600. **) 250. ungef.

Men, betraktar man den qualitativa ve-
getationen, så tyckes deu närligare sig till ett
räkt förhållande till sommar-månadernas
högsta temperatur. Om man på sådant sätt
betraktar saken, så får den följande utseen-
de:

<i>Skåne.</i>	<i>Uppland.</i>	<i>Lappland.</i>
Sånings o.) medium af Apr. början af Maj slutet af Maj		
Skördetid. medium af Aug. medium af Aug. med. af Aug.		
Vårsäden.)		

Således skulle vårsäden i Skåne beböfva
nära 4 månader***) till sin mognad, i Uppland
vid pass $3\frac{1}{2}$ samt i Lappland $2\frac{1}{2}$ månader. I
anledning häraf, tyckes sommar-månadernas
medeltemperatur i Lappland vara för låg i
anseende till samma månaders temperatur i
Uppland och Skåne. Ty det tyckes vara
enligt med sakens natur, att vårsäden behöf-
ver lika stor värmemängd till sin tillväxt
och mognad i Skåne, som samma slags säd be-
höfver till sin mognad i Lappland. Således bör
summan af vegetationstidens varme i Skåne va-
ra lika med summan af vegetationstidens varme

*) Mag. Forsand. l. c.

**) 642. Wahlenb. Fl. Ups.

***) Prof. Pehr Adr. Gadd, uti sin Svenska landt-
skötsel, antager 15 veckor till vårsädens mognad
i Skåne.