

- Lychnis alpina* L. B. G.
Cærastium alpinum L. B. G.
Potentilla nivea L. B.
Thalictrum alpinum L. B. G.
Draba hirta L. B. G.
Candamine billidefolia L. B. C.
Arabis alpina L. B. G.
Astragalus alpinus L. B. G.
Soncns alpinus L. B. G.
Hieracium alpinum L. B. G.
Serratula alpina L. B. G. T.
Gnaphalium alpinum L. B. G.
 — — *supinum* Wild. B. G.
Erigeron alpinum L. B.
 — — *uniflorum* L. B. G.
Tussilago frigida L. B. G.
Viola biflora L. B. G.
Carex capitata L. B. G. T.
 — *lagopina* Wg. B. G.
 — *ustulata* Wg. B.
 — *alpina* Sw. B. G.
 — *atrata* L. B. G.
 — *saxatilis* L. B. G.
 — *pulla* Good. B.
Salix lanata L. B. G.
 — *herbacea* L. B. G.
 — *reticulata* L. B. G.
 — *myrsinites* L. B.
 — *arbuscula* L. B. G. T.
Rodiola rosea L. B. G. etc.

§. 21.

Fjelldalar, dylika som Qwickjocks, finnas i alla Lappmarker med mer och minre förmonlig local. Om ock alla dessa fjelldalar icke kunna, i anseende till fjellarnes inflytelse, frambringa såd, så skola de likväl alltid blifva förmonliga för boskapsskötseln i anseende till sin gräsrikhet. Det är otroligt, med hvilken hastighet vegetationen uppdrifves i dessa dälder. — Jag har sett vissa grässlag, till exempel *tuftåteln* (*aira cæspitosa*), uppnå manshöjd på 6 veckors tid. Jag har sett *hundflokkan* (*aconitum septemtrionale*) uppränna 4 alnar i höjden på en månad. Det är dock ett näje att skåda dessa nordens praktvexter. Huru stolt reser sig icke den bladrika *toltan* (*sonchus alpinus*) med sina himmelsbla blomspigor; den silversfärgade *borsttisteln* (*carduus heterophyllus*) med sina purpursfärgade kronor; det aromatiska *påska* (*angelika archangelica*) med sina hvitstrålande parasoller och den yfviga *struth-onokeln* (*osmunda struthiopteris* L.)! — Dessa jättar bland örtvexter vittna om Qwickjocks yppiga vegetation.

§. 22.

Men ännu några ord om nybyggarnes odlings-sätt. Om vintern mäckas gödseln i Lappm.