

§. 15.

Salix arbuscula major, seu *orgyalis* (Wahlenb. Fl. L. n:o 476) in ipso loco (ad lacum Virihjaur) a me quoque observata, nullo modo ab ea differre videtur, quæ per universam Lapponiam vulgatissima ^{l)}, ad ripas fluminum omnium Lapponiarum, et prorsus eadem per totam Vestrobotniam, Angermanniam, superiorem Jemtlandiae usque, densissimas constituit silvas.

Hanc ad *S. majalem* semper detuli, ejusque nomine Botanicis Sveticis communicavi: cuius etiam meritiss. Koch. (in commentatione Sal. Eur.) particeps factus esse videtur, isque eam ad *Sal. arbusculam* citavit, cum qua etiam paullatim sed aperte confluit. Ab hac *S. majalis* vera, s. (germinibus glabris) in Vestrobotnia vulgaris, nihil, nisi germinibns glabris differre videtur.

Salix autem phylicifolia, (Wahlenb. Fl. L. n:o 482), cuius forma magis urbana seu campestris (Wahlenb. Fl. Sv. β.) in Svecia australiori occurrit, prorsus eadem est,

l) Arbor tenuis biorgyalis et supra, germinibus pubescentibus; foliis nitidissimis semper glabris et subtus eximie albo glaucescentibus. De hac in Fl. L. altum silentium? Suspicio tamen eam sub *S. majali* intellectam; quamquam *S. majalem* proprie sic dictam (germ. glabris) nullibi Lapponiæ vidi.