

spicatum β. *tenellum* α). Huc pertinet *Callitricha verna* β.
foliis omnibus linearibus, in rivulis et flaviis b), et *Spar-*
ganium natans, var. foliis ensiformibus et erectis in limo c).
Potamogetones tenuifolii seu marini, Ruppia maritima β.
rostrata, "in fretis fluenti mari oppositis." (Wahlenb. Fl.
Sv. n:o 207.); cum quibus comparari possunt *Zanichellia*
palustris β. *pedicellata*, et *Zostera marina* β. *oceanica*, nec
non *Ceratophyllum demersum* β. *submersum*, quae omnia
se in vicem confirmant. Nam ut supra dictum, quo altius

phæa pumila, et pari modo orta. Glacies enim radices *Ranun-*
culi aquatilis funditus evellit; sed reliquæ i. e. *radiculæ*,
ipsæ graciles, gracillimam edunt plantam; quæ tali modo diminuta,
præcox quoque facta est: Nam *Ranunculus aquatilis vulgaris*
nondum explicavit flores, hujus fructibus jam maturis. *Ran.* *aqua-*
tilis α, sæpius in alto et in aqua manante nascitur; unde et serius
floret, et folia valde elongata et eximie capillacea habet.

- a) Ad analogiam *Ran.* *aquatili* foliis tenuissimis est hæc *Myriophylli*
varietas, quia aut in amnibus rapacioribus, aut in alto fluminum pro-
venit, cum *M.* *spicatum* α. in stagnis vadosis nascitur.
- b) *C. tenuifolia* (Fries Nov. n:o 277.) "Seminibus acutangulis et
floribus inferioribus pedicellatis," dignosi dicitur, quæ mihi ne-
cessarius aquæ effectus esse videtur, et ex ipsius plantæ tenuitate
sequuntur, non tamquam character diversæ speciei, sed tamquam ne-
cessariæ analogiæ inter plantam et fructum vel inter omnes et sin-
gulas plantæ partes indicium.
- c) *Sparganium natans*, in flaviis foliis longissimis invenitur, sed ple-
rumque sterilis in hoc statu.