

4:to *alpicola*, spicalis inferioribus sæpe compositis, superioribus in spicam ovatam congestis; capsulis angustioribus acutis margine serrulatis, ore evidentius bifido; culmo sesquipedali. Hab. locis elevatis apricis per Lapponiām ubique. In his n:o 4. cespitose crescit, aliæ magis segregatæ.

*Carex panicea*, inter carices valde polymorpha, cuius notabiles varietates sunt:

1:mo *panicea* a, spicis exserte pedunculatis, contiguis, erectis; capsulis inflatis obtusis, ore subintegro, culmo abbreviato circiter semipedali, inferne folioso; foliis planiusculis. Hab. in Svecia australiori. Bracteæ foliaceæ, spicis breviores. Capsulæ albescentes.

2:do *tumidula*, spicis subinclusæ pedunculatis, distantibus (interstitio bipollicari inter spicas) ovato-oblongis; capsulis inflatis excurvis, violaceo-rubris, ore prominulo integro; culmo inferne foliaceo, subacutangulo, foliis linearis angustatis, canalicutatis, sursum triquetris, angulis acutissimis; bracteis foliaceis, spicas superantibus, acuminatis. Hab. in paludibus uliginosis rarius, ex gr. ad Njave Lappon. Lulensis, et Maunu Lappon. Tornensis. Quoad folia