

bracteasque *C. lividæ* simillima, sed culmo pedali, spicis-
que distantibus diversa.

Z:io sparsiflora, spicis remotis, exserte peduncula-
tis, sparsifloris; capsulis oblongis (haud inflatis) viridibus;
ore elongato, unilobo et bidentato; bracteæ longitudine pe-
duncularum, lanceolatae. Culmus inferne foliis duobus bre-
vissimis, lanceolatis planiusculis, apice navicularibus cinc-
ctus. Folia radicalia planiuscula, seu marginibus compla-
natis et medio tantum canaliculata, flaccida, ad terram
declinata. Hab. in ripis et pratis siccioribus totius Vestro-
bottniæ et Lapponiæ usque ad alpes altiores. *C. laxæ*
valde affinis.

Carex cæspitosa, culmo subnudo (id est duobus
tribusve foliolis brevissimis, alternis, culmi infimam par-
tem vagina truncata amplectentibus), foliis duplo triplove
longiore, spicis femineis binis, oblongis, numquam, quod
sciam, androgynis; mascula unica; culmo foliisque radica-
libus flaccidis. Hab. per universam Sveciam, in Lappo-
nia rarius. Foliola culmi brevissima, bracteæ *auriculato-*
aristatæ, spicam æquantes.

β. polymorpha, foliis longitudine culmi, vel inter-
dum longioribus, raro brevioribus; bracteis foliaceis, spicis