

duplo triplove longioribus; spicis femineis superne androgynis. Hujus formæ sunt: a) *campestris* spicis femineis binis, masculisque binis, aut femineis ternis, mascula unica; culmo crassiusculo, semipedali vel amplius. Hab. in pratis et campis graminosis subhumidis ubique. b) *lutescens* foliis lutescentibus, latiusculis, spicis femineis binis oblongis. Hab. in pratis uliginosis et juxta rivulos præsertim in Lapponia. Quia mollior, bonum pabulum præbet. a et b nunquam cæspites formare videntur, sed separatim crescunt. c) *cæspiticia* culmo foliisque elongatis laxioribus; spicis femineis subbinis. Squamis aterrimis. Hab. in omnibus paludibus uliginosis, ubi cæspites pedales vel altiores facit. d) *nardifolia* culmo foliisque filiformibus longissimis. Hab. in umbrosis occultis Lapponiæ etc. Has formas observandas putavi, quia non minimi sunt in œconomia momenti. Omnes ad varietatem β. pertinentes formæ, spicis androgynis, bracteis foliaceis, culmoque foliis longis prædicto dignoscuntur, quamquam extremæ ad strictam, acutam et saxatilem adeo approximantur, ut determinatu interdum valde sit difficile, utrum hujus an alterius sint individua.

*Carex stricta*, dignoscitur præcipue capsulis dense imbricatis adpressis, utrinque compressis et nervosis.